

**Guía ilustrada
de Mamíferos
y Aves Terrestres
de la Serranía de
los Paraguas**



Guía ilustrada de mamíferos y aves terrestres de la Serranía de los Paraguas

Autores:

María Juliana Bedoya-Durán

BIÓLOGA - UNIVERSIDAD DEL VALLE,

PH.D.(c) - UNIVERSITY OF FLORIDA

María Alejandra Florez Castro

BIÓLOGA - UNIVERSIDAD DEL VALLE

Impresión:

Alfagraphics

2018

ISBN: 978-958-48-4581-8

Citar este documento como:

Bedoya-Durán, M. J & Florez, M. A
2018. Guía ilustrada de mamíferos y
aves terrestres de la Serranía de los
Paraguas. Cali, Colombia

Se permite copia y distribución de este
documento, siempre que sea sin fines
de lucro, el material sea debidamente
acreditado y se reporte su uso a
mariajulianabedoya@gmail.com

Diseño, diagramación e ilustración:

Naturaleza Creativa

www.naturalezacreativa.org

Ilustradora: Dulfay Andrea Causaya P.

Tabla de contenido

Presentación.....	4
Introducción.....	6
Mamíferos terrestres	8
Convenciones.....	10
<i>Bassaricyon neblina</i>	11
<i>Potos flavus</i>	11
<i>Cabassous centralis</i>	12
<i>Dasybus novemcinctus</i>	12
<i>Cerdocyon thous</i>	13
<i>Coendou rufescens</i>	13
<i>Cuniculus paca</i>	14
<i>Dasyprocta punctata</i>	14
<i>Dinomys branickii</i>	15
<i>Sciurus granatensis</i>	15
<i>Didelphis pernigra</i>	16
<i>Didelphis marsupialis</i>	16
<i>Eira barbara</i>	17
<i>Procyon cancrivorous</i>	17
<i>Leopardus tigrinus</i>	18
<i>Leopardus pardalis</i>	18
<i>Leopardus wiedii</i>	19
<i>Puma concolor</i>	19
<i>Puma yagouaroundi</i>	20
<i>Panthera onca</i>	20
<i>Mustela felipei</i>	21
<i>Mustela frenata</i>	21
<i>Nasuella olivacea</i>	22
<i>Nasua nasua</i>	22
<i>Pecari tajacu</i>	23
<i>Mazama americana</i>	23
<i>Tamandua mexicana</i>	24
<i>Choloepus hoffmanni</i>	24
<i>Tremarctos ornatus</i>	25
Aves terrestres	26

Agradecimientos:

Queremos agradecer a todos los propietarios de fincas que decidieron convertir sus terrenos en reservas naturales por creer en la conservación del bosque, haciendo un aporte importante al medio ambiente de la región. Igualmente, agradecemos a las organizaciones Conservation Food and Health Foundation, Cleveland Metroparks Zoo and Cleveland Zoological Society, The Ron Magill Conservation Endowment a través del Departamento de Vida Silvestre y Conservación de la Universidad de La Florida (USA). A la Comisión Fulbright Colombia y al departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). Los fondos provenientes de estas entidades fueron determinantes para el desarrollo de la investigación y de esta guía ilustrada.

Agradecemos a los investigadores Lyn C. Branch (Universidad de la Florida) y Oscar E. Murillo-García (Universidad del Valle), pues su apoyo ha sido fundamental durante estos dos años de trabajo desde el diseño hasta el análisis de la información de la investigación; la cual busca entender el valor de conservación de las reservas de la sociedad civil para la conservación de mamíferos medianos y grandes en esta importante área de alta diversidad en los Andes Colombianos.

A los estudiantes de la Universidad del Valle Felipe Castro, Ricardo Ocampo y a la bióloga María Laura Gelin, egresada de la Universidad de Florida por su apoyo durante parte del trabajo de campo y en la clasificación de especies. Igualmente, agradecemos a los dueños de fincas y reservas que se involucraron en las jornadas de campo; A la organización Serraniagua por su apoyo permanente durante el desarrollo del proyecto, especialmente en las áreas correspondientes al municipio de El Cairo y a la Organización Corpoversalles por su apoyo en las áreas muestradas en el Municipio de Versalles y El Dovio. Finalmente, queremos agradecer a todos los jóvenes involucrados en los talleres de capacitación en Fototrampeo, su disposición e interés será clave para la continuación de este proceso.



Presentación

La Guía de los mamíferos y las aves terrestres de la zona andina de la Serranía de los Paraguas, está diseñada para generar aprendizaje, actualizar el conocimiento que se ha venido perdiendo de las especies y, vincular a todas aquellas personas que quieren aportar a la conservación. Con esto buscamos recuperar el conocimiento sobre las especies, con la finalidad de que niños y adultos reconozcan y aprendan generalidades, datos curiosos de las especies, sus mayores amenazas en el territorio y; por supuesto, el rol que dichas especies cumplen en nuestro ecosistema.

Prácticas ancestrales como la deforestación, la cacería y la introducción de especies domésticas (por ejemplo perros y gatos); se han convertido en los mayores problemas para la persistencia de las especies de mamíferos y aves terrestres en los bosques andinos. Actualmente, aunque la cacería es una práctica prohibida ante la legislación colombiana, su impacto es evidente sobre especies como la guagua, el saíno, el venado, los cusumbos y los armadillos. Muchas de estas especies medianas, presas de los depredadores de la serranía, son cada vez más escasas; lo que ha llevado a incrementar el conflicto entre los pobladores locales y depredadores como el puma y los tigrillos, quienes necesitan de estas presas para su supervivencia. De esta forma, las actividades humanas pueden alterar el equilibrio que debe existir en el ecosistema, debilitando las cadenas alimenticias en todos los niveles desde las plantas, pasando por las presas hasta los grandes depredadores.

Con la publicación de esta guía deseamos impulsar el conocimiento de la biodiversidad de la Serranía de los Paraguas. Adicionalmente, esperamos que la guía se convierta en un paso importante para que todos los actores reconozcan la importancia de la conservación de las especies silvestres; particularmente, y se involucren en el monitoreo y la detección de cambios en las poblaciones de mamíferos y aves terrestres. Cada uno de nosotros puede aportar a la disminución del riesgo de extinción de las especies a partir del adecuado conocimiento de estas y de sus amenazas. Por lo cual esperamos que esta guía sea el primer paso para conservar la biodiversidad presente en nuestro maravilloso territorio.



Introducción

En términos de biodiversidad, la Serranía de los Paraguas es clave para Colombia porque su posición geográfica permite la conexión estratégica entre dos regiones altamente diversas: el Chocó biogeográfico y los Andes Tropicales. El gradiente altitudinal de la Serranía (entre 0 y 3000 metros) abarca desde el bosque lluvioso de zonas bajas en el Chocó hasta el bosque lluvioso de montaña. Particularmente, la fauna de mamíferos de la presente guía corresponde a una investigación realizada en los bosques montanos de la serranía correspondientes a los municipios de El Cairo, Versalles y El Dovio (Valle del Cauca). Aunque estos municipios conservan un paisaje relativamente conectado en las zonas altas de las montañas, en las franjas protectoras de quebradas, en los cafetales con sombrío y en los cultivos frutales; estos están sufriendo procesos importantes de

deforestación. En el Cairo, es más evidente la conexión de dichos paisajes; mientras que en los

municipios de Versalles y el Dovio se evidencia un proceso más elevado de deforestación.

Ante la constante transformación del hábitat en los Andes Colombianos, se están promoviendo figuras de conservación diferentes a los Parques nacionales como una estrategia a través de la cual la sociedad civil se vincula directamente en procesos de conservación. Estas áreas, denominadas reservas naturales de la sociedad civil pueden jugar un papel vital para el futuro de la biodiversidad en Colombia; al servir de conexión entre grandes áreas de bosque o como refugios para algunas especies claves. Sin embargo, se desconoce el verdadero valor de esta estrategia pues son muy escasos los estudios que permiten evaluar la importancia de dichas áreas para la conservación.

Un componente importante en la conservación es el conocimiento de los recursos naturales incluyendo la fauna y la flora de



cada región. En particular, el conocimiento que tenemos sobre las especies que están en riesgo, dicho conocimiento permite tomar acciones concretas de protección del medio ambiente; haciendo que las prácticas en conservación y manejo sean un elemento presente en nuestro día a día.

Además de generar conocimiento científico que sirva para evaluar el papel que cumplen las reservas privadas en nuestro país, este ejercicio pretende exaltar la labor que propietarios y campesinos realizan para proteger estas áreas. Para lo cual nos enfocamos en un grupo de especies que se encuentran amenazadas por la cacería, y la pérdida de hábitat a través de la deforestación del bosque y el conflicto con los pobladores locales. Los mamíferos y las aves son grupos importantes en el mantenimiento del bosque tropical debido a que desempeñan un papel importante en procesos ecológicos claves como la polinización, la dispersión de semillas y el control de plagas. En particular, mamíferos grandes (como el jaguar, el oso de anteojos y el puma) desempeñan un papel importante, como depredadores tope, controlando especies de menor

tamaño; lo cual ayuda a mantener el equilibrio entre depredadores y presas; generando ecosistemas en equilibrio que son importantes para la provisión de servicios ecosistémicos vitales para nuestra sobrevivencia.

Esta guía de mamíferos medianos y grandes, en reservas y predios privados (53 áreas), es una publicación que evidencia el trabajo coordinado entre universidades, organizaciones no gubernamentales, dueños de reservas naturales y campesinos. Es una publicación que representa el compromiso de compartir el conocimiento sobre las especies de la zona y sus características principales. La conservación de las especies de plantas y animales es una tarea que debemos emprender como sociedad, y el conocimiento de las especies que habitan nuestro territorio es uno de los pasos fundamentales en la protección de dicha biodiversidad.



Mamíferos terrestres

Convenciones

Bassaricyon neblina

Olinguito
OLINGUITO

NT

Nombre científico

Nombre común

Nombre en Inglés

Tamaño



Establece el rango de tamaño de la especie

Estado de Amenaza Global y Nacional



Cada especie está catalogada con un estado de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y según el ministerio de Medio ambiente para Colombia

Actividad



La actividad define los momentos en los que cada especie se dedica a su alimentación y relaciones sociales: nocturno, diurno y crepuscular.

Reproducción



Presenta los periodos de gestación, número de crías, lactancia y madurez sexual de las especies.

Amenaza



Presenta las principales amenazas que presionan a las especies en su estado natural.

Depredador



Para algunas de las especies se definen los depredadores naturales.

Comportamiento



Se hace referencia a los comportamientos sociales y de hábitat en su estado natural.


Solitario




Gregario



Altamente arbóreo



Terrestre





Excavador



Madrigueras



Almizcle



Dieta

Compone la alimentación base de cada especie



Bassaricyon neblina

Olinguito
OLINGUITO

NT

Tamaño



Actividad



Reproducción

Gestación de 4 meses,
1 sola cría.

Amenaza

Población decreciendo

Depredador

Jaguar
Puma

Dieta



Comportamiento



Es una especie que fue descrita recientemente!! y ha sido registrada solo para Colombia y Ecuador.



Potos flavus

Perro de monte

Kinkajou

LC

Actividad



Reproducción

Gestación de 4 meses
1-3 Crías destetadas a los
4 meses.

Tamaño



Depredador
Jaguar
Puma

Dieta



Comportamiento



Amenaza


Cacería por su comercio
como mascota.
Población decreciendo.

Son importantes dispersores
de semillas y de plantas.



*Cabassous centralis*DD **Armadillo coiletrapo**
NORTHERN NAKED-TAILED ARMADILLO

Tamaño



Dieta

Utiliza sus garras en forma de hoz para cortar las raíces de los árboles en busca de insectos.



Reproducción
1 Sola cría

Actividad

Amenaza
Agricultura no
sostenible
Cacería.

Comportamiento
Su madriguera presenta un olor
fuerte a almizcle

*Dasypus novemcinctus*Armado, gurre NT
NINE-BANDED ARMADILLO

Comportamiento
Construyen 4 o más
madrigueras, 1 como hogar
y las otras como refugio.

Actividad

Depredador
Jaguar
Puma

Tamaño



Reproducción
Gestación de 7 meses
4 crías del mismo sexo.

Dieta

Amenaza
Casa excesiva sin
distinción entre
hembras con o sin
crías y machos.

Pueden aguantar la respiración hasta 6 minutos, con el fin de que no ingrese a sus vías respiratorias la tierra que van removiendo.

*Cerdocyon thous*LC **Lobo o Zorro Perruno**
CRAB-EATING FOX

Tamaño



Comportamiento

Andan solo con una pareja o en grupos de parejas pero solo cuando cazan si el recurso es abundante.

Actividad

Dieta

Reproducción
1-2 crías por camada.



Tamaño

*Coendou rufescens*Erizo, Puerco espín LC
STUMP-TAILED PORCUPINE

Dieta

Actividad

Hábitat
Habita en páramos,
bosques nublados y
bosques temporalmente
secos.

Comportamiento
Movimiento lento, se
refugia en huecos de los
árboles.

**Cuniculus paca****Guagua o paca**

AGOUTI

LC

Tamaño**Comportamiento**

(En periodo de reproducción, se ve la hembra con la cría) Altamente agresivos con individuos de su misma especie.

**Reproducción**

Periodo de gestación de 5.5 meses, 1 sola cría

**Amenaza**

Afectada por la cacería sin discriminación entre estados de desarrollo y sexo.

**Dieta****Actividad**

Las crías a un día de nacido pueden comer alimentos sólidos, nadar y bucear a gran velocidad.

**Dasyprocta punctata****Guatín**

CENTRAL AMERICAN AGOUTI

LC

Tamaño

LC

**Reproducción**

1-2 Crías por camada

**Dieta**

Tallos tiernos de Yuca o Maíz.

**Amenaza**

Intensamente cazada por su carne y retaliación por daño a cultivos.

**Actividad**

Depredador
Jaguar
Puma

Almacenan frutos en el suelo, por esto es también llamado el agricultor del bosque.

**Dinomys branickii****Guagua loba o pacarana**

PACARANA

Tamaño**Actividad****Comportamiento**

Viven en grupos familiares, macho + hembra y cría. Altamente territoriales. Terrestres.

**Dieta****Reproducción**

Gestación de 8 meses
2 crías

**Amenaza**

Cacería y reducción del hábitat. Perros domésticos pueden causarle problemas.

Para alimentarse, suelen sentarse sobre sus patas traseras y sostener el alimento con sus patas delanteras.

**Sciurus granatensis****Ardilla coliroja**

RED-TAILED SQUIRREL

LC


Tamaño**Comportamiento**

Solitario
El 60% del día están
Sentados

**Dieta****Actividad****Reproducción**

2-3 Camadas por año, el macho está solo presente durante la copula.
Gestación de 2 meses, 2 crías
Periodo de lactancia 61 días.

Las crías tienen los ojos cerrados los 30 primeros días de vida.

***Didelphis marsupialis*****Chucha común o Zarigüeya**


COMMON OPOSSUM

LC

***Didelphis pernigra*****Chucha orejiblanca o zariguella**



ANDEAN WHITE-EARED OPOSSUM

LC

***Eira barbara*****Zorro o tayra**

TAYRA

LC


Es un importante controlador de roedores
y ardillas cuando estas poblaciones se
incrementan.Tiene como costumbre lavar los alimentos
antes de consumirlos, y lavar sus manos y
trompa, por esto es llamado oso lavador.***Procyon cancrivorus*****Mapache u oso lavador**

CRAB-EATING RACCOON

LC



Uno de sus principales alimentos son los ratones lo cual evita que se vuelvan plaga.



Dieta



Reproducción

Gestación de 3 meses,
2-4 cachorros, amantados
durante un año y medio.



Actividad



Aunque pueden tener actividad diurna si el
hábitat no se encuentra muy intervenido.

Leopardus pardalis

LC

Ocelote
OCELOTE

Tamaño



Tercer felino más grande de Colombia



Comportamiento



Amenaza

Perdida y fragmentación
del hábitat.
Cacería y comercio ilegal
de mascotas y pieles.

Leopardus tigrinus

VU

Oncilla o tigrillo
ONCILLA

Tamaño



Felino más pequeño de Colombia
Apariencia esbelta



Amenaza

Cacería
Deterioro de su territorio,
a causa de la agricultura y
minería.



Actividad



Aunque pueden tener actividad diurna si el
hábitat no se encuentra muy intervenido.



Comportamiento



Excepto en época de apareamiento



Hábitat

Páramos y bosques
de niebla.



Reproducción

Gestación de 2.5 meses,
2 cachorros.

**Son excelentes
nadadores y
trepadores**

Leopardus wiedii

NT

LC

Margay
MARGAY

Colombia

Tamaño



Amenaza

Cacería y pérdida de hábitat
Población tiende a decrecer.



Comportamiento



Dieta



Marsupiales



Reproducción

Gestación de 2.5
meses, 1 cachorro.



Actividad



Aunque pueden tener actividad diurna si el
hábitat no se encuentra muy intervenido

Es el único felino que puede rotar sus tobillos
a 180° lo que le confiere una habilidad única
para bajar los árboles boca abajo.

Puma concolor

Puma o león de montaña
PUMA

LC

Tamaño



Segundo felino más grande de Colombia
(después del jaguar)



Actividad



Comportamiento



Dieta



Preferencia por los venados,
armadillos y cusumbos.



Reproducción

Gestación de 3 meses,
1-2 cachorros (generalmente
sobrevive 1), destetados a los
5 meses.



Amenaza

Puede llegar a depredar ganado y perros
domésticos, siendo esto una amenaza
para su sobrevivencia por cacería por
retaliación.

Dentro del territorio del
macho habitan 2 hembras que
solo se reproducen con él.


Puma yagouaroundi**LC** **Yaguarundi**

JAGUARUNDI, EYRA CAT

**Tamaño****Comportamiento****Actividad****Dieta**Su presa favorita son
los roedores.**Amenaza**Población cada vez más escasa
Pérdida de hábitat.**Reproducción**Gestación de 2.5 meses,
2 cachorros.**Tamaño****Panthera onca****Jaguar o Tigre Mariposo****NT** **VU**

JAGUAR

Colombia

**Dieta****Amenaza**Pérdida de hábitat por deforestación.
Cacería por venganza debido a depredación
de ganado y/o animales domésticos.
Disminución de presas silvestres.**Actividad****Reproducción**Gestación de 3 a 3.5 meses,
2 cachorros.Es el felino más
grande de América**Mustela frenata****Comadreja** **LC**
LONG-TAILED WEASEL**Comportamiento**Buen nadador y escalador
adaptable a muchos tipos de
ambiente.**Tamaño****Actividad****Dieta****Reproducción**Gestación de 8 meses,
6 crías, amamantadas
durante 2 meses.**Mustela felipei****VU** **EN** **Condumbí**
Colombia COLOMBIAN WEASEL**Dieta**Es uno de los carnívoros más raros de Suramérica, y
es el carnívoro más pequeño reportado para Colombia.**Tamaño****Amenaza**Fragmentación y contaminación de cuencas.
Poco conocimiento de su hábitat y distribución.**Reproducción**Gestación de 8 a 9 meses
4 - 5 Crías**Actividad****Comportamiento**Solitario
Terrestre

Nasua nasua
Cusumbo solino o coati **LC**
SOUTH AMERICAN COATI

Tamaño
Pequeño Mediano Grande

Dieta
Otros invertebrados

Actividad
Nocturno

Comportamiento
Vive en grupos pequeños conformado por padres e hijos.

Reproducción
Gestación de 2.5 meses,
1-6 crías destetadas a los 4 meses.
Madurez sexual a los 2 años.

Amenaza
Cacería ilegal.
Reducción de su hábitat.

En su primera semana de vida, las crías mantienen en la madriguera arbórea hecha por la madre y empiezan a acompañarla a pasear 2 semanas después del nacimiento.

Nasuella olivacea
Cusumbo de montaña **NT**
MOUNTAIN COATI

Tamaño
Pequeño Mediano Grande

Comportamiento
Hembras y crías permanecen en grupos grandes.
Machos solitarios desde sus 2 años de edad.

Actividad
Nocturno

Hábitat
Zonas altas, principalmente en los bosques de niebla y Páramo.

Dieta
Otros invertebrados

Amenaza
Población decreciente

La defensa de esta especie consiste en pararse en dos patas manteniéndose erguido, eventualmente golpea el suelo con sus patas anteriores y vuelve a erguirse.

Pecari tajacu
Pecarí de collar **LC**
COLLARED PECCARY

Tamaño
Pequeño Mediano Grande

Reproducción
Gestación de 3-5 meses,
2 crías del mismo color de pelaje pero sin collar.

Comportamiento
Viven en grupos de hasta 20 individuos, liderados por los machos.

Amenaza
Cacería ilegal.
Reducción de su hábitat.

Dieta
Otros invertebrados

Actividad
Nocturno

Mazama americana
Venado colorado **DD** **LC**
RED BROCKET DEER
Colombia

Tamaño
Pequeño Mediano Grande

Reproducción
Periodo de gestación de 7.5 meses, 1 sola cría.

Depredador
Grandes carnívoros,
función importante en la cadena alimenticia.

Amenaza
Cacería

Actividad
Nocturno

Dieta
Importante dispersor de semillas

Comportamiento
Solitario

Tamandua mexicana

LC

Oso hormiguero de collar o tamandúa


NORTHERN TAMANDUA

Tamaño**Particularidad**

Poseen poderosas garras que sirven para defenderse y alimentarse.

Reproducción

Se aparean una vez al año
Gestación de 5½ meses de 1 cría.
Período de lactancia: 6 meses.
Madurez sexual al primer año.

**Dieta****Actividad****Comportamiento****Amenaza**

Cacería con perros y destrucción del hábitat

***Choloepus hoffmanni*****Perezoso de dos dedos**

TWO-TOED SLOTH

LC

**Actividad****Reproducción**

Gestación de 11 meses
1 cría, la cual a los pocos días usa sus garras para aferrarse a la madre.

Tamaño**Dieta****Amenaza**
Cacería**Comportamiento****Tamaño**

Pueden vivir hasta 50 años en bosque y 30 años en cautiverio.

Tremarctos ornatus**Oso de anteojos**

VU

ANDEAN BEAR

**Actividad****Comportamiento**

Pacífico y tímido, huyen en todo lo posible a la presencia humana.

**Reproducción**

Gestación de 8 meses
2 crías, estas nacen sin dientes y con los ojos cerrados.
(Hasta 1-3 meses)

**Dieta****Amenaza**

Cacería ilegal
Reducción de su hábitat

Aves terrestres

Nothocercus bonapartei

Tinamu de montaña



Crypturellus soui

Gallinita de monte



Grallaria ruficapilla

Tororoi comprapán



Odontophorus hyperythrus

Perdiz colorada




Chamaepetes goudotii

Pava

Grallaria guatemalensis

El tororoi dorsiescamado



Grallaria allenii

El tororoi bigotudo



Grallaria flavotincta

El tororoi pechiamarillo



UF UNIVERSITY of FLORIDA




CONSERVATION, FOOD & HEALTH FOUNDATION



COLCIENCIAS
Ciencia, Tecnología e Innovación

FULBRIGHT
COLOMBIA
#BeFulbright
—60 years—



Serraniagua

CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND